„Die Werferschulter“

Dr. rer. nat. Robert Prill, M.Sc. PT

Vielen Dank!

Physiopark

A K A D E M I E

20-22 MAY 2026
PRAGUE

22ND ESSKA
CONGRESS

Wurfsportarten

- Regionale Unterschiede

Herleitung und Definitionsansatz

Instabilität

Laxität

Impingement

Laxität – Instabilität

Ausbreitung der neutralen Zone

Laxität

Laxität

- Zunahme der neutralen Zone vom Kapselbandapparat
- Kann ohne Schmerzen anwesend sein
- “ausrutschen“ des Caputs bzw. Glenoid während der Wurfbewegung

Schmerzgenerator:

- **Impingement** der Bursa SAD u./ o. Rotatorenmanschette
- SLAP-Läsion, Biceps caput longum
- exzentrische Überlastung der Rotatorenmanschette
- Traktionsneuropathie des N. suprascapularis

Beighton Score

Smits-Engelsman B, Klerks M, Kirby A. Beighton score: a valid measure for generalized hypermobility in children. *J Pediatr.* 2011 Jan;158(1):119-23, 123.e1-4.

Bockhorn LN, Vera AM, Dong D, Delgado DA, Varner KE, Harris JD. Interrater and Intrarater Reliability of the Beighton Score: A Systematic Review. *Orthop J Sports Med.* 2021 Jan 20;9(1):2325967120968099.

Beighton Score

- Hyperextension der 5. Fingers ($>90^\circ$) x/2
- Daumen an die Unterarme ($>10^\circ$) x/2
- Hyperextension der Ellenbogen ($>10^\circ$) x/2
- Hyperextension der Kniegelenke ($>10^\circ$) x/2
- Rumpfbeuge mit Handflächen auf den Boden x/1

Mit einem Beighton Score ≥ 5 wird man als generell Hypermobil eingestuft

Defintion Instabilität

Schulterinstabilität (v.a. anterior)

Die Schulterinstabilität ist gekennzeichnet durch eine Störung der dynamischen und statischen Stabilisatoren des Schultergelenks, die zu einer Luxation, Subluxation oder Apprehension mit entsprechenden Schmerzen führt.

Epidemiologie

- 0.08 pro 1000 Personenjahre
- 3%/Jahr bei jungen Männern
- Rugby und NFL bis zu 15% der Athleten

(Gibs 2015, Kawasaki 2014, Itoigawa 2016)

Instabilität mit Hypermobilität bei Überkopfsportlern

Hypermobilität

- Konservative Therapie?
- OP

Überkopfwurf: **Vorbereitungsphase**

Wind up

Early cocking

Late cocking

Überkopfwurf: **Wurfphase**

Acceleration

Follow through

Beispiel: Schmerzen bei **Late cocking**

Subluxation nach anterior

- **Schmerz posterior:**
- **Posterior-Superiores-Internes-Impingement**
- **Schmerz anterior:**
- **Anteriore Instabilität**

Beispiel: Schmerzen bei **Follow through**

**Impingement
anterior/superior**

- **Schmerz
anterior/lateral:**
- **Sub-coraco/-acromiales
Externes Impingement**
- **Anteriores-Superiores-
Internes-Impingement
durch post. Subluxation**

Untersuchung

Anamnese/Therapie/OP-Entscheidung

Late Cocking

Schmerz posterior? PSI: eher keine OP-> Dehnung posteriore Kapsel, SSC Training

Schmerz anterior: erst konservativ, bei Subluxationen wird
Chance schlechter

bei Luxation + Instabilitätstest pos.: OP

Follow through

Schmerz anterior/lateral:

Sub-coraco- oder -acromiales Impingement: Neuromuskuläre
exzentrische Kontrolle trainieren

Anteriores-Superiores-Impingement

durch post. Subluxation, einschließender Schmerz:

Training der exzentrisch arbeitenden Muskulatur, ggf. OP

Laxitätstest + Instabilitätstests

Anteriore-inferiore Kapsel

Glenohumerale Abduktion

> 105° Verdacht auf Laxität

Anteriore-superiore Kapsel

Load and Shift Test anterior
Kompression Kopf in der Fossa glenoidalis
Kopf translatorisch nach anterior Schieben mit gleichzeitiger Außenrotation

Anteriore-inferiore Kapsel

Relocation Test

„G.I.R.D.“
(glenohumerale internal rotation deficit)

www.iaom.de

Luxation: OP oder keine OP?

Bei Patienten, insbesondere bei aktiven Männern in den 20er und 30er Jahren, bei denen eine erstmalige Anteriore Schulterluxation mit einem chirurgischen Stabilisierungsverfahren behandelt wird, kann davon ausgegangen werden, dass im Vergleich zu Patienten, die nicht operativ behandelt werden, die Rate der wiederkehrenden Instabilität und die Notwendigkeit eines zukünftigen Stabilisierungsverfahrens deutlich geringer ist.

Therapie

Rehaprotokoll anteriore Instabilität

Ziele:

- ggf. Sicherung des OP-Ergebnisses
- Scapulothorakale Stabilisierung
- Zentrierung Humerus
- Integration in den Sport (Feed forward)

Relevante Rehabilitationsaspekte bei anteriorer Instabilität

- Reiz muss weg: Makro-, Mikrotraumen vermeiden (wenn mgl.)
- Kräftigung Scapulothorakal (Sensomotorik + Ermüdung)
- Dehnung posteriore Kapsel (G.I.R.D.)
- Rotatorenmanschette (v.a. Tonus, Kraft, Ermüdung SSC, ISP)
- Beweglichkeit BWS und CTÜ fördern in Extension und Rotation

1. Post(operative) Phase (0-6 Wochen)

Ziele:

- Schutz der Refixation
- Minimierung von Schmerzen und Entzündungen
- Erhalt der Mobilität angrenzender Gelenke (Ellenbogen, Handgelenk, Hand)

Immobilisierung von Abduktion
und Außenrotation

- **Immobilisierung:** Schlinge für 4-6 Wochen, abhängig vom Umfang der Refixation und den Vorgaben des Chirurgen
- **Passive Beweglichkeit (PROM):** Passive Bewegungsübungen im (vom Chirurgen) vorgegebenen Rahmen (z. B. Flexion, Abduktion, Außenrotation auf 30° begrenzt).
- **Gelenkschutz:** Vermeidung von aktiven Schulterbewegungen und Belastungen des Labrums (z. B. Heben, Überkopfarbeiten, übermäßige Außenrotation).
- **Schmerzkontrolle:** Kälteanwendungen (Kryotherapie) und ggf. entzündungshemmende Medikamente.

2. Frühe Wiederherstellung 6. – 12. Woche

Ziele:

- Wiederherstellung der kontrollierten Beweglichkeit
- Isometrie und Automobilisation scapulothorakal und RM (weit weg von Luxationsebene)
- Schutz der Refixation

Interventionen

- aktiv-assistierte Beweglichkeit: Progression zu aktiven Bewegungen im schmerzfreen Bereich
- Beginn mit isometrischen Übungen für die RM, den Delta und die Skapulastabilisatoren
- Skapulabeweglichkeit: Übungen wie Schulterblattretraktion und -depression zur Verbesserung der Kontrolle (Sensomotorik)

3. Kräftigungsphase (12-16 Wochen)

- Verbesserung von Kraft und Ausdauer
- Wiederherstellung funktioneller Bewegungsmuster
- Förderung der dynamischen Stabilität

Interventionen

WIDERSTANDSTRAINING:
EINFÜHRUNG VON LEICHTEM
GEWICHTSTRAINING FÜR DIE
ROTATORENMANSCHETTE UND DIE
SKAPULASTABILISATOREN.

**PROPRIOZEPTIVES
TRAINING:** GESCHLOSSENE
KETTENÜBUNGEN (Z. B.
WANDGLEITEN,
GEWICHTVERLAGERUNGEN IM
VIERFÜßLERSTAND) ZUR
VERBESSERUNG DER
GELENKSTABILITÄT.

BEWEGLICHKEITSFORTSCHRITT:
ERREICHEN EINER NAHEZU
NORMALEN BEWEGLICHKEIT UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG DER
ÄRZTLICHEN VORGABEN.

4. Funktionelle Wiederherstellung (16-24 Wochen)

Ziele:

- Wiederherstellung funktioneller Kraft und Ausdauer
- Integration in sportliche oder berufliche Aktivitäten

Interventionen:

- **Sportspezifisches Training:** Allmähliche Einführung in sportspezifische Übungen (z. B. Wurftraining für Überkopfsportler) unter Anleitung.
- **Dynamisches Krafttraining:** Ergänzung von plyometrischen Übungen, Liegestützen und fortgeschrittenen Widerstandsübungen zur Steigerung von Kraft und Kontrolle.
- **Einbindung der Rumpfmuskulatur:** Übungen zur Stärkung der Körpermitte zur Optimierung der kinetischen Kette.

Phase 4 16-24 Weeks of Shoulder Labrum Repair

After labrum repair
plyometrics
overhead

Light
pompas
drills

Light
scapular
drills

Light
scapular
engagement

drills
all

Push-ups

Sport

5. Rückkehr zum Sport

- Psychologische Faktoren sollten durch Scores und Feedback aus der Physiotherapie bewertet werden
- Die Rückkehr zum Sport sollte anhand folgender Kriterien erfolgen: Wiederherstellung der Kraft und Beweglichkeit (>90 % der Gegenseite), keine Instabilitätsangst, Schmerzfreiheit, sportartspezifische Fähigkeiten und Wiederherstellung der Propriozeption, ohne eine festgel

Open access

Qualitative research

- Klinisches follow up bis 12 Mon

BMJ Open
Sport &
Exercise
Medicine

From the mat to mastery: a Judoka's quest in the wake of injury – professional Judokas' experiences of suffering an anterior cruciate ligament injury

Hurly et al.. Part II-Glenoid Bone Grafting, Glenoid Os
Delphi Consensu

Ramana Piusi ,^{1,2} Moa Engström,¹ Robert Prill,^{3,4} Martin Hägglund ,^{5,6}
Andreas Ivarsson,^{6,7} Kristian Samuelsson,⁸ Hans-Christer Holmberg,^{6,9,10}
Eric Hamrin Senorski ,^{1,2,6}

Empfehlung: Zeit und Kriterienbasiert!

	1. Phase	2. Phase	3. Phase	4. Phase	RTS
Zeit	0-3/6 W	3/6-8/12W	8/12-12/16W	12/16-16/24W	> 4 Monate; eher 6-12 M
Kriterien	Schmerz ↓	Pass. Bew ↑	ASI >75%	Sportartspez. Aufgaben erfüllbar (qual. Bewertung)	Psyche 😊
	Entzündung ↓	Automob. ohne Schmerz	akt. BAM >90%		siehe. 4. Phase

Challenges and future perspectives

Article

A Random Effect of a around th Recreation:

Aleksandra Królik
Anna Kołcz ¹, Ma

Article

Reliability Performed Training I

Aleksandra Królik
Anna Kołcz ¹, Mac
and Łukasz Oleks

Active5™	Consecutive Tests	K-Force Plate	Consecutive Tests
	<p>180°; I test</p>		<p>180°; I test</p>
	<p>135°; Y test</p>		<p>135°; Y test</p>
	<p>90°; T test</p>		<p>90°; T test</p>

Figure 1. Functional return-to-play assessments.* (a) Overhand band reach. (b) Closed kinetic chain extremity stability test. (c) Upper extremity Y balance. (d) One-arm hop test. (e) Posterior Shoulder Endurance Test. (f) Trunk stability push-up. (g) Long arm plank ball tap. (h) Plank weight stacking.

*See Supplemental Video available in the online version of this article.

Kelley TD, Clegg S, Rodenhouse P, Hinz J, Busconi BD. Functional Rehabilitation and Return to Play After Arthroscopic Surgical Stabilization for Anterior Shoulder Instability. *Sports Health*. 2022 Sep-Oct;14(5):733-739.

Challenges and future perspectives

ECCENTRIC TRAINING FOR ROTATOR CUFF TENDINOPATHIES: A SYSTEMATIC REVIEW OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS

Muskelstabilität: Adaptive Force (AF)

-
AF & Muskelspindel:
 Bittmann et al 2023,
<https://doi.org/10.3390/ife13040911>
-
 Bittmann et al 2023,
<https://doi.org/10.3390/brainsci13071105>
-
AF & Gerüche:
 Schaefer et al 2021,
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-95759-0>
-
AF & Imaginationen:
 Schaefer et al 2022,
<https://doi.org/10.3390/brainsci12101318>
-
 Schaefer et al 2021,
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07827>
-
AF & Long COVID:
 Schaefer & Bittmann 2023,
<https://doi.org/10.3390/diagnostics13050882>
-
 Schaefer & Bittmann 2023,
<https://doi.org/10.3389/fmed.2022.879971>

Measurement in one of the areas of shoulder pain, shoulder function, shoulder muscle strength or morphological characteristics of muscles or tendons of the rotator cuff

- No differences between groups
- Tendencies of benefits of intervention group
- Statistical significant benefits of intervention group

(Carlisi et al. 2018) (Dejaco et al. 2017) (Maen-hout/Bateman & Adams 2014) (Fatima & Ahmed 2017)

Contact details
Robert.Schulz.Berlin@googlemail.com

References

Oak, Sameer R. et al.

Rehabilitation and Return to Play of the Athlete after an Upper Extremity Injury
Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation, Volume 4, Issue 1, e163 - e173

Kibler, W. B., Sciascia, A., & Wilkes, T. (2012).

Scapular dyskinesis and its relation to shoulder injury.

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 20(6), 364-372.

Bigliani, L. U., Pollock, R. G., McIlveen, S. J., Endo, K., & Flatow, E. L. (1992).

Tensile properties of the inferior glenohumeral ligament.

Journal of Orthopaedic Research, 13(4), 508-512.

American Physical Therapy Association (APTA):

Clinical Practice Guidelines for Shoulder Instability Rehabilitation.

Reinold, M. M., Escamilla, R. F., & Wilk, K. E. (2009).

Current concepts in the scientific and clinical rationale behind exercises for glenohumeral and scapulothoracic musculature.

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 39(2), 105-117.

Physiopark

A K A D E M I E

Dr. rer. nat. Robert Prill (M.Sc. PT)
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
+49 3381 411940
robert.prill@mhb-fontane.de

Universitätsklinikum Brandenburg
Medizinische Hochschule Brandenburg
Hochstraße 29
14770 Brandenburg an der Havel
www.klinikum-brandenburg.de

P3 – Physio Praxis Prill
Schillerstraße 54
15738 Zeuthen
www.p3-zeuthen.de